



Beroepsvaccinaties voor medewerkers

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste beroepsvaccinaties. Per vaccinatie zie je tegen welke ziekte je je kunt beschermen, hoe je besmet kunt raken, welke sectoren en beroepen een verhoogd risico lopen en hoe lang de vaccinatie bescherming biedt. Door risico's tijdig te herkennen en gericht te vaccineren, voorkom je uitval, bescherm je medewerkers en voldoe je aan je zorgplicht.

Iconen

- Beschermst tegen
- Besmetting via
- Risicoberoepen
- Beschermingsduur

Griep (Influenza)

- Griep, koorts
- Virus via lucht/contact
- Zorg, onderwijs, OV, klantcontact, werken in kleine ruimtes
- Vaccinatie beschermt gedurende 1 jaar; jaarlijkse vaccinatie is nodig.

Hepatitis A

- Leverontsteking, vermoeidheid, misselijk
- Infectie via besmet voedsel/water, slechte hygiëne
- Kinderopvang, riool, afvalverwerking, buitendienst
- Vaccinatie beschermt langdurig na 2 vaccinaties

Hepatitis B

- Ernstige leveraandoening
- Infectie via bloed/lichaamsvloeistoffen
- Zorg, lab, hulpdiensten, schoonmaak
- Vaccinatie beschermt levenslang na een reeks van 3 vaccinaties en een bloedonderzoek

Kinkhoest (DKT)

- Besmettelijke langdurige luchtweginfectie
- Bacterie via lucht
- Kinderopvang, zorgpersoneel (werken met kwetsbare groepen (zuigelingen))
- Vaccinatie beschermt gedurende 10 jaar; daarna is een herhalingsvaccinatie nodig.

Leptospirose (ziekte van Weil)

- Nier- en leveraandoening (Levensbedreigend)
- Bacterie via besmet oppervlakte water/modder
- Riool- en waterwerkers, ongediertebestrijders (ratten), grondverzetters (modder)
- Vaccinatie beschermt gedurende 2 jaar na een reeks van 3 vaccinaties.

Lyme (geen vaccin)

- Ernstige neurologische aandoeningen
- Tekenbeten
- Iedereen die buiten werkt in groen/natuur
- Geen vaccin beschikbaar; bescherming door voorlichting, persoonlijke beschermingsmiddelen en bewustwording

Mazelen (BMR)

- Vlekjes, koorts en verkoudheid, verzwakking immuunsysteem
- Zeer besmettelijk virus via de lucht verspreid
- Zorg, onderwijs, kinderopvang, ambulancepersoneel
- Vaccinatie beschermt volledig na 2 vaccinaties (indien niet eerder gevaccineerd of ziek geweest)

Rabiës (hondsdoelheid)

- Hondsdolheid
- Beten en krabben van besmette zoogdieren (o.a. honden en vleermuizen)
- Dierenartsen, labmedewerkers, boswachters
- Vaccinatie beschermt na 2 vaccinaties; na een incident is altijd actie nodig

Tekenencefalitis (TBE)

- Hersenvliesontsteking door teken
- Tekenbeten in natuurgebieden
- Mensen die in het groen werken zoals boswachters, hoveniers, ecologen, militairen
- Vaccinatie beschermt gedurende 3 jaar na een reeks van 3 vaccinaties.

Tetanus (DKT)

- Ernstige wondinfecties
- Snij- en schaafwonden
- Bouw, agrarisch, in het groen, afvalverwerking, dierenzorg
- Vaccinatie beschermt 10 jaar; bij een vuile wond kan na 5 jaar een herhaling nodig zijn

Vogelgriep (bescherming via griepvaccinatie)

- Long- en ademhalingsproblemen
- Contact met besmette vogels. Door dubbele infectie kan nieuw hybride-virus ontstaan
- Pluimveesector, vogelruimers, natuurbeheer
- Vaccinatie beschermt gedurende 1 jaar; jaarlijkse griepvaccinatie is nodig.



Reizigersvaccinaties

Verkrijgbaar via [Port Health Center \(PHC\)](#)