



MEDICAMENTOS UROLÓGICOS DE USO FRECUENTE EN PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA

Oxibutinina

Marca comercial: Ditropan, Oxytrol

Vía de administración: oral (líquido o tableta), parche cutáneo

Acción: disminuye los espasmos vesicales (relajante vesical) y aumenta el tamaño de la vejiga

Efectos secundarios: sequedad bucal, enrojecimiento facial, estreñimiento

Comentarios: parche Oxytrol en Amazon.com, CostPlusDrugs.com

Mirabegrón

Marca comercial: Myrbetriq

Vía de administración: oral (líquido o tableta)

Acción: disminuye los espasmos vesicales

Efectos secundarios: aumento de la presión arterial

Comentarios: Actualmente, es difícil conseguir el líquido. No todas las aseguradoras aprobarán este medicamento. Contáctese con nuestro equipo si tiene dificultades para obtenerlo.

Gentamicina

Vía de administración: solución por vía uretral o derivación urinaria de Mitrofanoff

Acción: previene las infecciones de las vías urinarias

Comentarios: La solución se puede preparar en casa con gentamicina y suero fisiológico. No todas las aseguradoras aprobarán este medicamento.

Tamsulosina

Marca comercial: Flomax

Vía de administración: oral (tableta)

Acción: relaja los músculos del cuello de la vejiga

Efectos secundarios: mareos, dolor de cabeza

Comentarios: CostPlusDrugs.com

*Nota: Estos medicamentos requieren receta médica. Consulte a su proveedor de atención urológica si le interesan las sugerencias para ahorrar dinero que se mencionan en los comentarios del presente documento.



Tolterodina

Marca comercial: Detrol

Vía de administración: oral (tableta)

Acción: disminuye los espasmos vesicales

Efectos secundarios: sequedad bucal, mareos, estreñimiento

Comentarios: CostPlusDrugs.com

Nitrofurantoína

Marca comercial: Macrobid, Macrochantin

Vía de administración: oral (líquido o tableta)

Acción: previene las infecciones de las vías urinarias

Efectos secundarios: dolor de cabeza, diarrea

Trimetoprim-sulfametoxazol

Marca comercial: Bactrim, Septra

Vía de administración: oral (líquido o tableta)

Acción: previene las infecciones de las vías urinarias

Efectos secundarios: náuseas, vómitos, sarpullido

Comentarios: CostPlusDrugs.com

Solifenacina

Marca comercial: Vesicare

Vía de administración: oral (tableta)

Acción: relajante vesical

Efectos secundarios: sequedad bucal, estreñimiento, malestar estomacal, vista borrosa/ojos secos, somnolencia

Toxina botulínica

Marca comercial: Botox

Vía de administración: inyección en la vejiga

Acción: relajante vesical

Efectos secundarios: retención urinaria que requiere cateterización, micción dolorosa temporal, dificultad temporal para orinar

Comentarios: El procedimiento bajo anestesia. Tiene que repetirse cada 6 meses, con monitoreo urodinámico. Suele poder usarse como reemplazo de los relajantes vesicales diarios.



Si tiene preguntas o inquietudes, contáctenos al: Spina Bifida Program |
202-476-SPNA (7762) spinabifida@childrensnational.org