

**Zaldiar® 37,5 mg/325 mg - Filmtabletten: Qualitative und quantitative**

**Zusammensetzung:** 1 Filmtablette enthält 37,5 mg Tramadolhydrochlorid und 325 mg Paracetamol. **Sonstige Bestandteile:** Tablettenkern: Cellulosepulver, vorverkleisterte Stärke, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Maisstärke, Magnesiumstearat.

Filmüberzug: Hypromellose, 1,878 mg Lactosemonohydrat (= 1,784 mg Lactose), Titandioxid (E 171), Macrogol 6000, Eisenoxid gelb (E 172), Propylenglykol, Talk.

**Anwendungsgebiete:** Zaldiar 37,5 mg/325 mg Filmtabletten sind angezeigt zur symptomatischen Behandlung von mäßig starken bis starken Schmerzzuständen. Die Anwendung von Zaldiar 37,5 mg/325 mg Filmtabletten soll auf Patienten beschränkt werden, deren mäßig starke bis starke Schmerzen eine Behandlung mit einer Kombination von Tramadol und Paracetamol erfordern. **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile; akute Vergiftungen mit Alkohol, Schlafmitteln, zentral wirkenden Analgetika, Opioiden oder Psychopharmaka; Zaldiar 37,5 mg/325 mg Filmtabletten dürfen nicht angewendet werden bei Patienten, die Monoaminoxidase-Hemmer erhalten oder innerhalb der vergangenen 2 Wochen erhalten haben; schwerwiegende Leberfunktionsstörungen; therapeutisch nicht kontrollierte Epilepsie. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Opioiden in Kombination mit Nicht-opioiden Analgetika; ATC Code: N02A J 13. **Inhaber der**

**Zulassung:** Grünenthal Österreich GmbH, 1060 Wien. **Verschreibungspflicht /**

**Apothekenpflicht:** S1, apothekenpflichtig. *Informationen zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.* **Stand der Information: Dezember 2025**

---