

# Сторонні тіла рогівки у дрібних тварин

By [Sara M. Thomasy](#), DVM, PhD, DACVO, Department of Surgical and Radiological Sciences, School of Veterinary Medicine, University of California-Davis

Medically Reviewed Mar 2020 | Modified Nov 2022

Сторонні тіла рогівки у домашніх тварин спостерігаються часто. Зазвичай це органічні матеріали, але також можна побачити сторонні тіла у вигляді піску, металу та скла. Головні **ознаки включають варіабельний блефароспазм, сльозотечу та варіабельний рефлекторний увеїт** (опалесценція водянистої вологи, міоз, набряк райдужної оболонки, гіпотонія ока та можливий гіпопіон).

Сторонні тіла можна визначити на поверхні кон'юнктиви, у задній третині склепіння повіки або на рогівці чи в ній.

**Тіла, що прилипають до поверхні ока, зазвичай видаляються під місцевою анестезією або за допомогою сильного зрошення, або невеликими зубчастими офтальмологічними затискачами.** Якщо чужорідне тіло пройшло в глибші шари рогівки або проникло в передню камеру, необхідна загальна анестезія для обережного видалення або з передньої поверхні рогівки, або з передньої камери. **Перед видаленням стороннього тіла обов'язково потрібно встановити його локалізацію (тобто його глибину всередині рогівки).** Якщо є сумніви, слід припустити, що воно проникає в передню камеру.

На рану рогівки накладають прості вузлові шви розсмоктувальним матеріалом від 7-0 до 9-0. Післяопераційна терапія зазвичай включає місцеві та системні антибіотики широкого спектру дії, мідріатики та системні НПЗП. Прогноз для зору зазвичай хороший. Нечасті ускладнення включають варіабельне утворення рубця на рогівці, септичний ендoftальміт, утворення катаракти та вторинну глаукому.

## Додаткова інформація

Також перегляньте матеріал про здоров'я свійських тварин щодо пошкоджень рогівки у тварин.

### Поверхнєве стороннє тіло рогівки, собака



ЛЮБ'ЯЗНО НАДАНО ЛІКАРЕМ К.  
ГЕЛАТТОМ.