

Розриви повік у дрібних тварин

By **Sara M. Thomasy**, DVM, PhD, DACVO, Department of Surgical and Radiological Sciences, School of Veterinary Medicine, University of California-Davis

Медичний огляд Mar 2020 | Змінено Nov 2022

Пластика розривів повік повинна виконуватися якнайшвидше. Рвані рани із залученням краю повік вимагають точного співставлення, щоб запобігти довгостроковим дефектам у вигляді виїмок і порушенню функції повік. Двошарове ушивання рекомендується для всіх видів тварин, причому глибокий шар захоплює тарзальну пластину і круговий м'яз ока (горизонтальний петлеподібний шов розсмоктувальним шовним матеріалом від 3-0 до 6-0), а поверхневий шар (шкіра) ушивається вісімкоподібним швом по краю повіки з подальшим накладанням простого вузлового шва з використанням шовку від 3-0 до 6-0. Через 7–10 днів шкірні шви слід зняти. Коли шкірні шви накладені, повіку буде необхідно захистити від самотравмування за допомогою елизаветинського коміра (собаки та коти) або жорсткої накладки на око (коні). Оскільки через набряклу повіку може бути порушене мигання, для захисту рогівки може знадобитися тимчасова тарзорафія. Післяопераційна терапія часто включає призначення місцевих антибіотиків, а також системних антибіотиків та НПЗП.

Розрив верхньої повіки, кінь



ЛЮБ'ЯЗНО НАДАНО ЛІКАРЕМ К.
ГЕЛАТТОМ.