

# Синдром раптової набутої дегенерації сітківки (SARDS) у дрібних тварин

By **Sara M. Thomasy**, DVM, PhD, DACVO, Department of Surgical and Radiological Sciences, School of Veterinary Medicine, University of California-Davis

Медичний огляд Mar 2020 | Змінено Nov 2022

Синдром раптової набутої дегенерації сітківки виникає у **собак**, причому, згідно із повідомленнями, ним частіше страждають такси, цвергшнауцери, мопси та бретонські епаньолі. Клінічні зміни включають **гостру втрату зору** (часто відбувається протягом кількох днів), широко розширені зіниці із поганою реакцією на світло або її відсутністю, і відносно нормальний зовнішній вигляд очного дна. Найчастіше хворіють собаки середнього та старшого віку, із великою відсотковою перевагою стерилізованих самок, в яких присутні клінічні ознаки, які включають збільшення ваги, млявість, поліурію, полідипсію та поліфагію.

В діагностиці може допомогти кольорова пупілометрія, оскільки червоне світіння зіниці відсутнє, тоді як синє світіння залишається. Для остаточного діагнозу необхідна електроретинографія, виконана офтальмологом. При синдромі раптової набутої дегенерації сітківки спостерігається плоска електроретинограма. Навпаки, нормальна електроретинограма вказує на захворювання зорових шляхів, тому необхідне подальше обстеження у невролога. Протягом кількох місяців при огляді очного дна можна спостерігати ознаки дегенерації сітківки, включаючи гіперрефлексивність тапетуму та збіднення судинного малюнку сітківки. На сьогодні **повідомлень про ефективне лікування не було**.