

Panduan untuk Pesakit dan Keluarga

Luka Bernanah



Apa itu luka yang bernanah?

Luka yang bernanah berlaku apabila jangkitan kuman atau bahan asing terkumpul di dalam luka yang menyebabkan kesakitan.



Nanah boleh didapati di seluruh bahagian tubuh badan tetapi biasanya ia memerlukan perhatian segera jika ia didapati di kaki, tangan & punggung, buah dada; peri dubur atau daripada folikel rambut.

Rawatan

Luka bernanah boleh dirawat dengan pengambilan antibiotik. Bergantung pada jenis dan saiz luka yang bernanah. Bagi prosedur saliran pula, pembedahan mungkin dilakukan untuk mengeluarkan nanah. Selepas pembedahan, luka biasanya dibiarkan terbuka supaya baki atau nanah yang baru boleh menyalir keluar.

Penjagaan luka bernanah setelah pembedahan



- Habiskan antibiotik seperti yang ditetapkan
- Tukar pembalut luka mengikut arahan
- Sekiranya terdapat luka dibahagian luar dubur atau luar kemaluan, siram dengan air setiap kali ia dicemari dengan air kencing atau najis
- Jangan merokok, kerana merokok akan mengganggu keupayaan luka dari penyembuhan
- Dapatkan rawatan sekiranya ada tanda -tanda jangkitan kuman

