

患者和家属指南

儿童疫苗接种须知





疫苗与其他药物一样，可能引发一些不良反应。虽然严重反应（如嘴唇或眼睛肿胀，抽搐，呼吸急促，甚至失去意识）极为罕见，但仍有发生的可能。

因此，儿童接种疫苗后留在接种等候区观察 15 至 30 分钟非常重要，以便在发生严重不良反应时能够及时获得处理。

如果在观察 15 至 30 分钟后，儿童状况良好且感到舒适，请前往柜台付款并安排下次预约。

以下是一些常见的疫苗反应以及您可以在接下来几天内采取的应对措施：

局部反应 (注射部位红肿,疼痛)



- 在红肿或疼痛处冷敷
- 请依照护士建议服用对乙酰氨基酚，以缓解不适

发烧



- 定时监测体温 (发烧是指 37.5 摄氏度及以上)
- 补充额外液体 (如母乳，配方奶或水)
- 给孩子穿上轻便，凉爽的衣服
- 用温水为孩子洗澡
- 请依照护士建议服用对乙酰氨基酚退烧

烦躁/难以安抚



- 通常会在 24 至 48 小时内自行消失，无需治疗

注射部位出现小硬块



- 可能会持续数周或数月，无需治疗

并发症（如有）



如果出现以下情况，请咨询医生：

- 退烧药未能有效降低体温
- 发烧持续超过 24 小时
- 孩童不如以往活跃
- 持续哭闹
- 癫痫(痉挛)：少数孩童可能在高烧后出现痉挛
- 注射部位红肿加重
- 出现腹痛或腹部痉挛，腿部蜷曲至胸前，腹部胀气，呕吐，或者大便中带血，尤其是在接种轮状病毒疫苗后

