


结肠镜检查：肠胃病手术科

筛查可以挽救您的生命

结直肠癌是美国第二大癌症杀手。如果您年满 45 岁，或者有癌症家族史，进行结直肠筛查可以挽救您的生命。

- 结直肠癌通常始于直肠或结肠中一种叫做息肉的非癌性生长物。
- 结肠镜检查能发现**息肉**，以便在它们演变成癌症之前将其切除。
- 结肠镜检查也能在早期发现结直肠癌，那时治愈的机率还很高。



结肠息肉

检查前准备：需要携带的物品

- 请让成人（年满 18 岁或 18 岁以上）开车送您回家。完成检查后，您必须在成人陪同下乘坐出租车、医疗运输工具或公共汽车。
- 请带上您服用的所有药物，包括非处方药
- 请带上您所服用的任何维生素和补充剂
- 请带上您的保险卡

药物

如果您存在以下情况，请在检查前至少**提前一周**，联络您的医生以获取用药说明。

- 正服用治疗糖尿病的药物
- 做过心脏瓣膜置换手术
- 正服用 Plavix、Brilinta、Aggrenox 或任何其他抗血小板药物
- 正服用 Coumadin (Warfarin)、Xarelto、Pradaxa、Eliquis、Savaysa 或其他血液稀释药物
- 一直在服用 Aspirin，除非医生告知停用该药

Suflave™ 肠道准备

检查前 5 天

填写您的清肠准备处方并查看以下说明。

您会收到 2 个瓶子和 2 袋调味包。

必须清除结肠中所有固体物质，以便医生能够清楚查看。

如果结肠不够干净，您的检查可能会被取消。



检查前 3 天

- 请勿食用生的蔬果、籽类或坚果，及奶制品。
- 停止摄入铁和纤维补充剂
- 混合并冷藏肠道准备溶液
- 规划好回家路线

结肠镜检查：检查准备

检查前 2 天

请勿食用任何固体食物。早晨开始清流质饮食。

- 清流质饮食示例：清汤（鸡汤或牛肉汤）、水、苹果汁、佳得乐、冰棒以及咖啡或茶（不含牛奶或奶精）。您可食用硬糖。
- 请勿饮用任何红色或紫色流质
- 饮用至少 8 杯水或清流质以保持水分。

检查前 1 天

请勿食用任何固体食物。开始饮用清肠溶液。

- 将 1 袋调味包倒进 1 瓶 Suflave™ 中。用温水注满直至瓶子的注水线。盖上瓶盖，摇一摇，直至粉末混合均匀。为保证最佳口感，在饮用前将溶液放入冰箱冷藏 1 小时。
- 每隔 15 分钟饮用 8 盎司的溶液，直到喝完整瓶。
- 晚上至少喝 2 杯水。
- 如果您呕吐，请等待 30 分钟之后每隔 15 分钟饮用四分之三杯（6 盎司）溶液，直至喝完半瓶。

温馨

- 迅速喝下药物。
- 用清水或漱口水漱口。

提示

- 尝试用吸管喝药。
- 嚼硬糖。

检查前 5 - 8 小时

- 饮用第二瓶 Suflave™。
- 每间隔 15 分钟饮用 8 盎司的混合物，直到喝完整瓶。
- 晚上至少喝 2 杯水。
- 服用医生批准的药物。
- 您可以服用阿司匹林、降压药、强的松或其他类固醇药物。
- 保持清流质饮食。
- 您的大便应该是澄清的黄色液体。

检查前 2 小时

请勿进食或饮用任何东西，否则您的检查可能会被取消。

如需预约、更改预约或取消预约，请拨打 (773) 702-6767。

请提前 1 小时到达检查处。

- Hyde Park 地点：** Center for Care and Discovery (CCD) 7th Floor
5700 South Maryland Ave, Chicago, IL 60637 **(773) 702-6767**
- Tinley Park 地点：** Ingalls Family Care Center, Entrance C
6701 West 159th Street Tinley Park, IL 60477 **(708) 429-0222**
- River East 地点：** UChicago Medicine River East
355 East Grand Ave, Chicago, IL 60611 **(773) 795-4662**
- Orland Park 地点：** 14290 South Lagrange Road,
Orland Park, IL 60462 **(773) 834-9445**