

TEXAS★ENDOSCOPY

6405 W. Parker Rd, Suite 370 • Plano, Texas 75093 • 972-473-9900
8080 Independence Parkway, Suite 160 • Plano, TX 75025 • 972-908-3000

Instrucciones de preparación para EGD

- DEBE TENER TRANSPORTE desde la facilidad con un familiar o amigo adulto. No taxis, Uber, Lyft u otro medio de transporte público. De lo contrario, su procedimiento será cancelado.
- Si está tomando Plavix, Coumadin (Warfarina), Lovenox, Eliquis, Brilinta o cualquier otro anticoagulante recetado, es muy importante que notifique a la enfermera las instrucciones sobre cuándo DETENER este medicamento antes de su procedimiento. Si está tomando 325 mg de aspirina, cambie a 81 mg de aspirina diariamente 7 días antes de su procedimiento y permanezca con esta dosis antes del procedimiento. Si ya está tomando 81 mg de aspirina, no detenga antes del procedimiento.
- NO comer después de la MEDIANOCHE la noche antes de su procedimiento. La mañana de su procedimiento SOLO puede tomar líquidos claros, hasta 4 horas antes de la hora de su procedimiento.
* Líquidos claros: agua, té, café (sin leche / crema), refrescos, caldo de pollo o res, jugo de manzana, bebidas deportivas, paletas y gelatina. NO productos rojos, morados o lácteos!
- Tome sus medicamentos para la presión arterial, el corazón, las convulsiones y la tiroides con un sorbo de agua cuatro horas antes de su procedimiento.
- Llame al consultorio de su médico si tiene alguna pregunta.