

EGD/EUS 준비하기

시술 7일 전

약물 복용:

혈액 희석제 -

- **Plavix, Coumadin (Warfarin), Lovenox, Xeralto, Eliquis, Brilinta** 또는 기타 처방된 혈액 희석제를 복용 중인 경우, 시술 전에 간호사에게 해당 약물의 복용을 언제 중단해야 하는지 알리는 것이 중요합니다.
- **325mg Aspirin** 을 복용 중인 경우 시술 7일 전에 매일 81mg Aspirin 으로 복용량을 바꾸고 시술 전까지 이 용량을 유지하세요.
- 이미 81mg Aspirin 을 복용 중인 경우 시술 전에 복용을 중단하지 마세요.

GLP - 주사 1회

다음 약물은 시술 7일 전에 반드시 복용을 중단해야 합니다. 시술 전 복용을 중단하지 않으면 시술이 취소되고 일정을 다시 잡아야 합니다.

- **GLP-1 주사제(당뇨병 및/또는 체중 감량용)**
 - **Ozempic(세마글루타이드) - Wegovy(세마글루타이드) - Trulicity(둘라글루타이드) - Bydureon (엑세나타이드) - Mounjaro(트리제파타이드) - Zepbound(트리제파타이드)**
- **체중 감량 약물:**
 - **Adipex(펜터민)**

시술 전날 저녁:

- 시술 전날, 자정 이후에는 고형 음식 섭취 금지

시술 당일:

- 시술 당일 아침에는 **시술 4시간 전까지**, 맑은 유동식만 섭취할 수 있습니다.

맑은 유동식에는 다음이 포함됩니다.

- **물, 차, 커피(우유/크리머 제외), 탄산음료, 닭고기 또는 소고기 육수, 사과 주스, 스포츠 음료, 아이스바, 젤리.**
- **빨간색, 보라색, 유제품 섭취 금지!**

약물 복용일 또는 시술:

- **혈압, 심장, 발작 및/또는 갑상선 약 - 시술 6시간 전에 물 한 모금과 함께 복용하세요.**

시술 시간 4시간 전에는 물을 포함해 어떠한 음식도 섭취하지 마세요!

중요 가임기 또는 55세 이하 여성은 체크인 시 임신 테스트를 위해 소변 샘플을 제공해야 합니다. 소변 샘플을 제공하지 못하면 시술이 취소됩니다.

- 시술 후 집에 데려다줄 사람이 있어야 합니다.
이는 가족, 친구 또는 승인된 의료 이송 서비스 제공자이어야 합니다.
대중교통, Uber, Lyft 또는 기타 차량 공유 서비스는 이용하실 수 없습니다.
- 취소 및 노쇼 정책이 있습니다
시술 예약일로부터 72시간 이내에 취소하는 경우 수수료가 부과됩니다
시술에 나타나지 않을 경우 수수료가 부과됩니다.
- **궁금한 점이 있으시면 972-943-8440 으로 사무실에 문의하세요**