

의료 서비스 제공자 정보

이름:
주소:
시:
주:
우편번호:
전화:
팩스:

SUPREP® 결장경 검사 준비 키트

(황산나트륨, 황산칼륨 및
황산마그네슘)
경구 복용 용액

6온스당 (17.5g/3.13g/1.6g)



SUPREP 결장경 검사 준비 키트는 여러 차례에 걸쳐 투여(2일)하는 약제입니다. 6온스 약병 두 개를 모두 복용해야 준비가 완료됩니다.

1차 복용: 시술 전 저녁 오후 _____ 시에 1단계를 시작하여 아래와 같이 복용합니다.

잠자리에 들기 전 6온스짜리 병 한 개(1)를 이용하여 1단계에서 4단계를 모두 마쳐야 합니다.

1단계



SUPREP 6온스짜리
병 한 개(1)를 혼합
용기에 붓습니다.

2단계



용기에 16온스
라인까지 차가운
식수를 넣고
섞습니다.


참고: 사용하기 전에
지침에 따라 원액을
희석시킵니다.

3단계



용기 안에 담긴
용액을 모두
마십니다.

4단계



앞으로 1시간 동안
16온스 용기에 담긴
물을 두 번(2) 더
마셔야 합니다.

2차 복용: 시술 전 아침 오전 _____ 시에 1단계를 시작하여 위와 같이 복용합니다.

이번 복용에서는 다른 6온스 병을 사용하여 위의 1단계부터 4단계를 반복하십시오.

참고: 결장경 검사를 시작하기 최소 2시간 전에 또는 별도의 지침에 따라 마지막 잔의 물을 마셔야 합니다.

(뒷면의 추가 지침을 참조하십시오.)

시술 전 날...

먹어도 괜찮은 것:

- 가벼운 아침 식사나 투명한 색의 음료만 섭취하고, 저녁에는 아무것도 먹지 마십시오.

먹으면 안 되는 것:

- 우유를 마시지 마십시오
- 빨간색 또는 보라색을 띠는 음식을 섭취하거나 마시지 마십시오
- 알코올 음료를 마시지 마십시오

마셔도 좋은 음료:

- 물
- 사과, 오렌지, 백포도 또는 화이트 크랜베리를 포함한 과일 주스(과육 불포함)
- 라임에이드 또는 레모네이드
- 커피 또는 차(유제품 또는 비 유제품 크림을 넣지 않은 것)
- 닭고기 수프
- 과일이나 토핑이 없는 젤라틴 디저트 (빨간색 또는 보라색 제외)

참고:

- SUPREP 결장경 검사 준비 키트는 성인의 결장경 검사를 위한 준비 단계로서 결장 청소를 위한 것입니다.
- 담당 의사에게 처방약, 비처방약, 비타민 및 허브 보충제를 포함하여 현재 복용 중인 모든 의약품에 대해 반드시 알려십시오. SUPREP 결장경 검사 준비 키트는 다른 의약품의 효능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- SUPREP 결장경 검사 준비 키트의 매회 복용을 시작하기 전 1시간 내에 경구용 약물을 복용할 경우 제대로 흡수되지 않을 수 있습니다.
- SUPREP 결장경 검사 준비 키트를 투여한 후 가장 흔히 발생하는 부작용으로는 전반적인 불편감, 복부 팽만감, 복통, 메스꺼움, 구토 및 두통이 있습니다.
- SUPREP 결장경 검사 준비 키트에 관한 질문이 있으시면 담당 의사에게 연락하십시오.

(뒷면의 추가 지침을 참조하십시오.)

키트 안에 동봉된 처방 정보 및 복용 안내서를 모두 읽으십시오.

본 제품에 관한 자세한 정보는, 1-800-874-6756번으로 전화하시거나 www.suprepkit.com을 방문해 주십시오.

의료 서비스 제공자의 특별 지침

귀하의 시술

시간/날짜:

장소:

질문이 있으시면 다음 연락처로 귀하의 의료 서비스 제공자에게 연락하십시오.