

# ENDOSCOPIA DE TEXAS

6405 W. Parker Rd, Suite 370 • Plano, Texas 75093 • 972-473-9900  
8080 Independence Parkway, Suite 160 • Plano, TX 75025 • 972-908-3000

**\*DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**

**\*Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de preparación intestinal, llame al consultorio de su médico:**

**La oficina de McKinney es 972-562-4430 La oficina de Plano es 972-.943-9094**

## Instrucciones de preparación para EGD/ENDOSCOPIA SUPERIOR

### 7 días antes del procedimiento:

#### **INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS:**

- SI está tomando estos medicamentos semanalmente para bajar de peso, debe suspenderlos durante 7 días antes de la fecha de su procedimiento:** Cualquier semiglutida: Ozempic®, Wegovy®, Trulicity®, Bydureon®, Mounjaro®, Zepbound®. Si no ha suspendido estos medicamentos, se cancelará su procedimiento.
- SI está tomando estos medicamentos diariamente para la diabetes, debe suspenderlos el día anterior a su procedimiento:** Rybelsus®, Victoza®, Saxenda®, Byetta®, Invokana®, Steglatro®, Farxiga®, Adlyxin®. Si no ha suspendido estos medicamentos, su procedimiento será cancelado.
- SI está tomando Plavix®, Coumadin® (Warfarin®), Lovenox®, Eliquis®, Brilinta® o cualquier otro anticoagulante recetado,** es muy importante que notifique a la enfermera del consultorio de su médico gastrointestinal para obtener instrucciones sobre cuándo **DEJE** de tomar este medicamento antes de su procedimiento (ver los números arriba).
- SI está tomando un medicamento dietético que contiene el producto PHENTERMINE® DEBE SUSPENDER ESTE MEDICAMENTO 4 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**
- SI está tomando 325 mg de Aspirina®, Comdian Cadosis 81 mg de Aspirina®** Por 7 días antes de su procedimiento **está tomando 81 mg de Aspirin®, no lo suspenda antes del procedimiento a menos que su médico gastrointestinal o el médico que le recete este medicamento se lo indique específicamente.**
- NO coma NUECES ni SEMILLAS,** es decir, palomitas de maíz, fresas, etc. durante los 7 días anteriores al Procedimiento.

## Instrucciones de preparación para EGD/ALCANCE SUPERIOR:

### El día anterior al procedimiento:

1. NO coma nada después de la MEDIANOCHE de la noche anterior a su procedimiento.

### El día del procedimiento:

1. 4 HORAS ANTES del procedimiento nada en la boca
2. La mañana de su procedimiento podrá tener SÓLO LÍQUIDOS CLAROS hasta por 4 horas antes de su procedimiento
3. **Lista de líquidos:** Té, Café Negro (sin crema), Coca-Cola®, Sprite®, refrescos dietéticos, pollo, o caldo de res, Jell-O®, Popsicles® (Not Fruit Sickles®), jugo de manzana, jugo de arándano (roj natural), Gatorade®, Powerade® y agua. **Absolutamente ningún producto ROJO/MORADOS.** No se permiten jugos de naranja, leche ni productos lácteos como cremas.
4. **Deberá tomar cualquier medicamento para la tiroides, la presión arterial, las convulsiones y la ansiedad.**

**\*\*NO tome sus medicamentos para la diabetes esta mañana antes del procedimiento\*\***

**\*DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**