

ENDOSCOPIA DE TEXAS

6405 W. Parker Rd, Suite 370 • Plano, Texas 75093 • 972-473-9900
8080 Independence Parkway, Suite 160 • Plano, TX 75025 • 972-908-3000

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft No ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**

***Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de preparación intestinal, llame al consultorio de su médico:
La oficina de McKinney es 972-562-4430 La oficina de Plano es 972-943-9094**

Instrucciones de MIRALAX® para colonoscopia. Esta es una preparación de dos partes

7 días antes del procedimiento:

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS:

- SI está tomando estos medicamentos semanalmente para bajar de peso, debe suspenderlos durante 7 días antes de la fecha de su procedimiento:** Cualquier semiglútida: Ozempic®, Wegovy®, Trulicity®, Bydureon®, Mounjaro®, Zepbound®. Si no ha suspendido estos medicamentos, se cancelará su procedimiento.
- SI está tomando estos medicamentos diariamente para la diabetes, debe suspenderlos el día anterior a su procedimiento:** Rybelsus®, Victoza®, Saxenda®, Byetta®, Invokana®, Steglatro®, Farxiga®, Adlyxin®. Si no ha suspendido estos medicamentos, su procedimiento será cancelado.
- SI está tomando Plavix®, Coumadin® (Warfarin®), Lovenox®, Eliquis®, Brilinta® o cualquier otro anticoagulante recetado,** es muy importante que notifique a la enfermera del consultorio de su médico gastrointestinal para obtener instrucciones sobre cuándo **DEJE** de tomar este medicamento antes de su procedimiento (ver los números arriba).
- SI está tomando un medicamento dietético que contiene el producto PHENTERMINE® DEBE SUSPENDER ESTE MEDICAMENTO 4 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**
- SI está tomando 325 mg de Aspirina®, Combian Ca dosis a 81 mg de Aspirina® Por días 7 días antes de su procedimiento.** Si está tomando 81 mg de Aspirin®, no lo suspenda antes del procedimiento a menos que su médico gastrointestinal o el médico que le recete este medicamento se lo indique específicamente.
- NO coma NUECES ni SEMILLAS,** es decir, palomitas de maíz, fresas, etc. durante los 7 días anteriores al Procedimiento.
- NO REFRIGERAR EI PURGANTE/MANTENGALO A TEMPERATURA AMBIENTE**

Instrucciones de MIRALAX® para colonoscopia. Esta es una preparación de dos partes:

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

1. Si no ha comprado su preparación intestinal antes del día anterior al procedimiento, vaya a su Farmacia de tu elección y compra productos Miralax® para tu preparación. Compre botellas de 2 a 238 g
 - A) **El día anterior al procedimiento:**
 - ¡DEBES seguir una dieta de líquidos claros TODO EL DÍA, comenzando tan pronto como te levantes! (NO ALIMENTOS SÓLIDOS)
 - 1. Lista de líquidos: Té, Café Negro (sin crema), Coca-Cola®, Sprite®, refrescos dietéticos, pollo o carne de res caldo, Jell-O®, Popsicles® (Not Fruit Suckles®), jugo de manzana, jugo de arándano (rojo natural), Gatorade®, Powerade® y agua.
 - 2. Absolutamente no se permiten productos **ROJOS/MORADOS**. No se permiten jugos de naranja, leche ni productos lácteos como Cremas o Cremas no lácteas.
 - 3. **Deberá tomar cualquier medicamento para la tiroides, la presión arterial, las convulsiones y la ansiedad. Tome sólo media dosis de sus medicamentos para la diabetes.**

B) La Noche Previa al Procedimiento:

1. **A las 6:00 p. m.**, mezcle la botella entera de Miralax de 238 gramos en 64 oz. de agua o luz Cristalina limonada®. Beba 32 onzas de la mezcla en 1 hora.
2. Para aliviar las náuseas mientras bebe la preparación, intente usar una pajita y/o chupar una rodaja de limón.

C) ***Si a las 9 p. m.** no ha defecado o no está pasando un líquido amarillo claro (parece como orina) de su recto, MEZCLE un recipiente de 238 gramos de Miralax® en 64 oz. de agua. Beber la mitad (32 oz) de esta mezcla durante 1 hora.

D) ****Si a las 10 p. m.** todavía no Pasas líquidos amarillos claros del recto, beb la otra mitad. (32 oz) de mezcla durante 1 hora.

E) ****Si a las 10:30 p. m.** no ha defecado a las 10:30 p. m., llame a nuestro médico gastrointestinal. consultorio para los médicos de guardia.

DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

1. **6 horas antes** del procedimiento, mezcle la botella entera de Miralax de 238 gramos en 64 oz. de agua o Cristal limonada ligera®. Beba 32 onzas de la mezcla en 1 hora.
 - a). Para aliviar las náuseas mientras bebe la preparación, intente usar una pajita y/o chupar una rodaja de limón.
2. Nada por **vía oral 4 horas antes** de su procedimiento, excepto: Puede tomar Tiroides, Medicina Para las Sangre Medicamentos para la presión o la ansiedad, el corazón o las convulsiones con pequeños sorbos de agua a más tardar 2 horas antes de su procedimiento

****NO tome sus medicamentos para la diabetes esta mañana antes del procedimiento****

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft No ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**