

ENDOSCOPIA DE TEXAS

6405 W. Parker Rd, Suite 370 • Plano, Texas 75093 • 972-473-9900
8080 Independence Parkway, Suite 160 • Plano, TX 75025 • 972-908-3000

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**

**Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de preparación intestinal, llame al consultorio de su médico:
La oficina de McKinney es 972-562-4430 La oficina de Plano es 972-.943-9094*

Instrucciones de preparación intestinal Suglave® para colonoscopia Esta es una preparación de dos partes:

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS:

- **SI está tomando estos medicamentos semanalmente para bajar de peso, debe suspenderlos durante 7 días antes de la fecha de su procedimiento:** Cualquier semiglútida: Ozempic®, Wegovy®, Trulicity®, Bydureon®, Mounjaro®, Zepbound®. Si no ha suspendido estos medicamentos, se cancelará su procedimiento.
- **SI está tomando estos medicamentos diariamente para la diabetes, debe suspenderlos el día anterior a su procedimiento:** Rybelsus®, Victoza®, Saxenda®, Byetta®, Invokana®, Steglatro®, Farxiga®, Adlyxin®. Si no ha suspendido estos medicamentos, su procedimiento será cancelado.
- **SI está tomando Plavix®, Coumadin® (Warfarin®), Lovenox®, Eliquis®, Brilinta® o cualquier otro anticoagulante recetado,** es muy importante que notifique a la enfermera del consultorio de su médico gastrointestinal para obtener instrucciones sobre cuándo **DEJE** de tomar este medicamento antes de su procedimiento (ver los números arriba).
- **SI está tomando un medicamento dietético que contiene el producto PHENTERMINE® DEBE SUSPENDER ESTE MEDICAMENTO 4 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**
- **SI está tomando 325 mg de Aspirina®, Combian Ca dosis a 81 mg de Aspirina® Por 7 días antes de su procedimiento.** Si está tomando 81 mg de Aspirin®, no lo suspenda antes del procedimiento a menos que su médico gastrointestinal o el médico que le recete este medicamento se lo indique específicamente.
- **NO coma NUECES ni SEMILLAS,** es decir, palomitas de maíz, fresas, etc. durante los 7 días anteriores al Procedimiento.
- **NO REFRIGERAR EL PURGANTE/MANTENGALO A TEMPERATURA AMBIENTE**

SUGLAVE® BOWEL PREP Instrucciones para la prescripción de colonoscopia es una preparación de dosis dividida en 2 partes

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

1. Si no recibió su preparación intestinal antes del día anterior al procedimiento, comuníquese con su El consultorio del médico al números anteriores.
 - R) Además de su preparación intestinal, compre dos envases de botellas de 238 g de Miralax® (laxante de venta libre)
 - B) **El día anterior al procedimiento:**
 - ¡DEBES seguir una dieta de líquidos claros TODO EL DÍA, comenzando tan pronto como te levantes! (NO ALIMENTOS SÓLIDOS)
 - 1. **Lista de líquidos:** Té, Café Negro (sin crema), Coca-Cola®, Sprite®, refrescos dietéticos, pollo o carne de res caldo, Jell-O®, Popsicles® (Not Fruit Sickles®), jugo de manzana, jugo de arándano (rojo natural), Gatorade®, Powerade® y agua.

2. **Absolutamente no se permiten productos ROJOS/MORADOS.** No se permiten jugos de naranja, leche ni productos lácteos como cremas.
3. **Deberá tomar cualquier medicamento para la tiroides, la presión arterial, las convulsiones y la ansiedad. Tome sólo media dosis de sus medicamentos para la diabetes.**

C) La noche anterior al procedimiento:

1. A las 6:00 p. m., complete los siguientes 2 PASOS para la parte 1 de su preparación de 2 partes.
 - a) Abra 1 botella y llénela con agua tibia hasta la línea de llenado. Agregue un sabor a lima limón empacar si lo desea. Coloque la tapa en la botella y agite hasta que todo el polvo se haya disuelto. Tú Puede enfriar la solución en el refrigerador o agregar hielo si lo desea. Beba 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que la botella esté vacía.
2. A las 7:00 p. m., beba 16 oz de agua, termine dentro de los 30 minutos D) ****Si a las 9 p. m. no ha defecado o no está eliminando un líquido amarillo claro a claro del recto, MEZCLA un envase de 238 gramos de Miralax® en 64oz. de agua. Beba la mitad (32 oz) de esto. mezcla durante 1 hora.**

D) ****Si a las 10 p. m. todavía no Pasas líquidos claros, beb la otra mitad (32 oz) de la mezcla durante 1 hora.**

E) ****Si a las 10:30 p. m. no ha defecado a las 10:30 p. m., llame a nuestro médico. consultorio para los médicos de guardia.**

El día del procedimiento:

- A)
 1. 6 horas antes de su procedimiento, complete los siguientes 2 PASOS para la parte 2 de su Preparación de 2 partes.
 - a) Abra 1 botella y llénela con agua tibia hasta la línea de llenado. Agregue un sabor a lima limón empacar si lo desea. Coloque la tapa en la botella y agite hasta que todo el polvo se haya disuelto. Tú Puede enfriar la solución en el refrigerador o agregar hielo si lo desea. Beba 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que la botella esté vacía
 2. 5 horas antes del procedimiento, beba 16 onzas de agua y termine en 30 minutos. Si tu Las deposiciones no son de color amarillo claro como la orina. Comuníquese con su médico gastrointestinal. oficina para obtener más instrucciones.
 3. Nada por vía oral 4 horas antes de su procedimiento excepto: Puede tomar Tiroides Medicina Para Las, Medicamentos para la presión arterial, el corazón, las convulsiones o la ansiedad con pequeños sorbos de agua a más tardar 2 horas antes de su procedimiento.

****NO tome sus medicamentos para la diabetes esta mañana antes del procedimiento****

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**