

ENDOSCOPIA DE TEXAS

6405 W. Parker Rd, Suite 370 • Plano, Texas 75093 • 972-473-9900
8080 Independence Parkway, Suite 160 • Plano, TX 75025 • 972-908-3000

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft No ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**

**Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de preparación intestinal, llame al consultorio de su médico:
La oficina de McKinney es 972-562-4430 La oficina de Plano es 972-.943-9094*

Instrucciones de preparación intestinal Suprep® para colonoscopia Esta es una preparación de dos partes:

□ INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS:

- **SI está tomando estos medicamentos semanalmente para bajar de peso, debe suspenderlos durante 7 días antes de la fecha de su procedimiento:** Cualquier semiglútida: Ozempic®, Wegovy®, Trulicity®, Bydureon®, Mounjaro®, Zepbound®. Si no ha suspendido estos medicamentos, se cancelará su procedimiento.
- **SI está tomando estos medicamentos diariamente para la diabetes, debe suspenderlos el día anterior a su procedimiento:** Rybelsus®, Victoza®, Saxenda®, Byetta®, Invokana®, Steglatro®, Farxiga®, Adlyxin®. Si no ha suspendido estos medicamentos, su procedimiento será cancelado.
- **SI está tomando Plavix®, Coumadin® (Warfarin®), Lovenox®, Eliquis®, Brilinta® o cualquier otro anticoagulante recetado,** es muy importante que notifique a la enfermera del consultorio de su médico gastrointestinal para obtener instrucciones sobre cuándo **DEJE** de tomar este medicamento antes de su procedimiento (ver los números arriba).
- **SI está tomando un medicamento dietético que contiene el producto PHENTERMINE® DEBE SUSPENDER ESTE MEDICAMENTO 4 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**
- **SI está tomando 325 mg de Aspirina®, Comian Ca dosis a 81 mg de Aspirina® POR 7 días antes de su procedimiento** Si está tomando 81 mg de Aspirin®, no lo suspenda antes del procedimiento a menos que su médico gastrointestinal o el médico que le recete este medicamento se lo indique específicamente.
- **NO coma NUECES ni SEMILLAS,** es decir, palomitas de maíz, fresas, etc. durante los 7 días anteriores al Procedimiento.
- **NO REFRIGERAR ESTA EL PURGANTE/MANTEGLALA TEMPERATURA AMBIENTE**

Instrucciones de preparación intestinal SUPREP® para colonoscopia. Esta es una preparación de dos partes:

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

1. Si no recibió su preparación intestinal antes del día anterior al procedimiento, comuníquese con su El consultorio del médico al números anteriores.
R) Además de su preparación intestinal, compre dos envases de botellas de 238 g de Miralax® (laxante de venta libre)
B) **El día anterior al procedimiento:**
¡DEBES seguir una dieta de líquidos claros TODO EL DÍA, comenzando tan pronto como te levantes! (NO ALIMENTOS SÓLIDOS)
 1. Lista de líquidos: Té, Café Negro (sin crema), Coca-Cola®, Sprite®, refrescos dietéticos, pollo o carne de res caldo, Jell-O®, Popsicles® (Not Fruit Suckles®), jugo de manzana, jugo de arándano (rojo natural), Gatorade®, Powerade® y agua.

2. **Absolutamente no se permiten productos ROJOS/MORADOS.** No se permiten jugos de naranja, leche ni productos lácteos como cremas.
3. Deberá tomar cualquier medicamento para la tiroides, la presión arterial, las convulsiones y la ansiedad. Tome sólo media dosis de sus medicamentos para la diabetes.

C) La noche anterior al procedimiento:

1. A las 6:00 p. m., completa los siguientes pasos de la parte 1 de tu preparación de 2 partes usando tu SUPREP®:

- a) Vierta una botella de 1-6 oz de SUPREP® en un vaso de 16 oz
- b) Agregue 10 oz de agua fría únicamente (16 oz en total)
- c) Beba una taza entera de 16 oz.
- d) Beba 2 tazas más de agua de 16 oz cada una (un total de 3 a 16 oz de líquido)
- e) Beber todo en 1 hora.

D) ****Si a las 9 p. m.** no ha defecado o no está pasando un líquido amarillo claro (parece como orina) de su recto, MEZCLE un recipiente de 238 gramos de Miralax® en 64 oz. de agua. Beber la mitad (32 oz) de esta mezcla durante 1 hora.

E) ****Si a las 10 p. m.** todavía no Pasas líquidos amarillos claros del recto, beb la otra mitad. (32 oz) de mezcla durante 1 hora.

F) ****Si a las 10:30 p. m.** no ha defecado a las 10:30 p. m., llame a nuestro consultorio para Medicina Para Las los médicos de guardia.

Día del Procedimiento:

A) 1. 6 horas antes de su procedimiento:

- a) Vierta una botella de 1-6 oz de SUPREP® en un vaso de 16 oz
- b) Agregue 10 oz de agua fría únicamente (16 oz en total)
- c) Beba una taza entera de 16 oz.
- d) Beba 2 tazas más de agua de 16 oz cada una (un total de 3 a 16 oz de líquido)
- e) Beber todo en 1 hora.

2. Nada por vía oral 4 horas antes de su procedimiento excepto: Puede tomar Tiroides, Medicamentos para la presión arterial, el corazón, las convulsiones o la ansiedad con pequeños sorbos de agua a más tardar 2 horas antes de su procedimiento.

****NO tome sus medicamentos para la diabetes esta mañana antes del procedimiento****

***DEBE TENER TRANSPORTE desde las instalaciones por parte de un familiar o amigo adulto. No taxis, No Uber, No Lyft No ningún otro transporte público, ni siquiera servicios de transporte médico pagados o no pagados. Si no cuenta con este transporte cuando llegue, se le cancelará su(s) procedimiento(s).**